


Ανεύρυσμα αορτικού τόξου

Ενδοαγγειακή θεραπεία με Μόσχευμα με δύο
κλάδους

- Άνδρας 85 ετών.
- Τυχαίο εύρημα έκκεντρο ανεύρυσμα **αορτικού** τόξου 50 χιλιστών με συμμετοχή της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας.



Αξονική αγγειογραφία 08/02.2025





Διακλινικό συμβούλιο

- Εκκεντρο ανεύρυσμα : Κίνδυνος ρήξης.
 - Ασθενής 86 ετών, χωρίς σημαντική συννοσηρότητα, δραστήριος [διατηρεί θέση σε προσωπική επιχείρηση].
 - εγγύτητα με αριστερή κοινή καρωτίδα
 - μικρή απόσταση μεταξύ αριστερής κοινής καρωτίδας και ανωνύμου αρτηρίας
- αορτικό ενδαγγειακό μόσχευμα με κλάδους για ανώνυμο αρτηρία και αριστερή κοινή καρωτίδα.
- αριστερή καρωτιδο-υποκλείδιο παράκαμψη.
- εμβολισμός της αριστερής υποκλειδίου




Integrated branch provides sealing and fixation in the brachiocephalic artery, stabilizing the implantation and contributing to exclusion of the aneurysm

CURVED ASCENDING STENT GRAFT

Allows natural alignment to the ascending aorta, maximizing fixation and sealing


Inwards bent stents oriented along the outer curve of the ascending aorta are bent inwards



NEXUS DUO™
BY ENDOSPAN

AORTIC ARCH
STENT GRAFT SYSTEM
CUSTOM-MADE DEVICE

Εισαγωγή του μοσχεύματος από δεξιά κοινή
μηριαία αρτηρία στην ανώνυμη αρτηρία.




Im: 1/371
Se: 18

ANTONIADIS CHRISTOS Mr
382496
19/11/1939 M
MEDITERRANEO HOSPITAL
2025060404570113


Fluoroscopy - stored

WL: 2048 WW: 4096 [D]
LAO: 48 CRA: 5


4/6/2025 4:44:52 μμ



εισαγωγή του τμήματος για την ανιούσα αορτή




εκπτυξη του μοσχεύματος ανιούσας




αγγειογραφία πριν τον εμβολισμό της
αριστερής υποκλειδίου.



εμβολισμός υποκλειδίου με amplatzer plug



τελικός αγγειογραφικός έλεγχος



- Στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιστατικών που γίνεται είτε με τρεις είτε με δύο κλάδους και εγγύς ζώνη σφράγισης την ανιούσα. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί καθώς δεν είναι περιστατικό με έναν κλάδο για την LSA. Υπάρχει και μόσχευμα με 3 κλάδους το οποίο δεν ήταν εφαρμόσιμο στον συγκεκριμένο ασθενή.
-
- Αυτό που το κάνει την επέμβαση πρωτοποριακή και την διαφοροποιεί σε σχέση με τις αντίστοιχες επεμβάσεις είναι ο καθετηριασμός και η γεφύρωση των αγγείων του τόξου αποκλειστικά από τις μηριαίες αρτηρίες είτε πρόκειται για δύο είτε για τρεις κλάδους. Και είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που η συγκεκριμένη επέμβαση έχει τόσο χαμηλό stroke rate (3.6%) έναντι του >20% που έχουν τα άλλα ενδαγγειακά μοσχεύματα.